

MyCARE

With me, every step of the way



“ **ஹைபோகிளைசிமியா**
அறிகுறிகள் கண்டறியப்பட்டால்
உடனடியாக **சிகிச்சை**
தொடங்கப்பட வேண்டும்.

”

இந்த

15-15

சிகிச்சை விதியை

பின்பற்றவும்

முதலாவதாக

விரைவாக செயல்படக்கூடிய

கார்போஹைட்ரேட்களை 15 கிராம்

எடுத்துக் கொள்ளவும்



15 கிராம் கார்போஹைட்ரேட் என்பது
கிட்டத்தட்ட 3 தேக்கரண்டி
சர்க்கரை / குளுக்கோஸ் அல்லது
கிட்டத்தட்ட 4 குளுக்கோஸ்
மாத்திரைகள்




இரண்டாவதாக

15 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும்,
பின்னர் மீண்டும் இரத்த குளுக்கோஸ்
அளவை சரிபார்க்கவும்




இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு இன்னும்
<70 mg/dL நிலையிலேயே
இருந்தால் **அதே சிகிச்சையை**
மீண்டும் தொடரவும்.



கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய
சில முக்கியமான
முன்னெச்சரிக்கைகள்



இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு
>70 mg/dL இருக்கும்போது,
ஹைபோகிளைசிமியா மீண்டும்
நிகழ்வதைத் தவிர்க்க, பழங்கள்,
பன்னீர்/முட்டை நிறைந்த ரொட்டி
போன்ற **கார்போஹைட்ரேட்**
மற்றும் புரதம் நிறைந்த சிற்றுண்டி/
உணவை உண்ணவும்.




ஐஸ் க்ரீம், சாக்லேட், இந்திய இனிப்புகள்
அல்லது டெஸர்ட்ஸ் போன்ற **சக்தி**
நிறைந்த உணவுகளைக் கொண்டு
ஹைபோகிளைசிமியாவை
ஒருபோதும் சரிசெய்யக் கூடாது,
இவை இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு
உயர்வதற்கு நேரம் எடுத்துக்
கொள்ளலாம்.



நீங்கள் குறைந்த இரத்த குளுக்கோஸ்
நிகழ்வு காரணமாக மயக்க நிலையில்
இருந்தால், உறவினர்கள் அல்லது
உதவியாளர்கள் **வாய் மூலமாக
எதையும் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்**
மற்றும் அருகில் உள்ள
மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக
செல்ல வேண்டும்.




தீவிர ஹைபோகிளைசிமியாவிற்கு
சிகிச்சை அளிக்க, நீங்கள்
வீட்டில் குளுக்ககான் ஊசியை
வைத்திருக்கலாம்.




குறிப்பு : மேலும் தகவலுக்கு உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.


இரவு நேர ஹைபோகிளைசிமியாவை
தவிர்க்க **படுக்கை நேரம் மற்றும்
அதிகாலை 3 மணிக்கு இரத்த
குளுக்கோஸ் அளவை
சரிபார்ப்பது நன்று.**



நீங்கள் குறைந்த இரத்த குளுக்கோஸ்
அளவை கொண்டுள்ளீர்களா
என்பதை நீங்கள் **உங்கள் இரத்த
குளுக்கோஸ் அளவை
சரிபார்க்கத்துக் கொள்வதால்**
எளிதல் கண்டறியலாம்.



நீங்கள் ஹைபோகிளைசிமியாவின்
அறிகுறிகளை அனுபவித்தால்,
உங்கள் இரத்த குளுக்கோஸ்
அளவை பரிசோதிக்க
இயலாவிட்டாலும்,
**ஹைபோகிளைசிமியா
சிகிச்சையை அளிக்கவும்.**



“ மேலும் தகவல்களுக்கு, உங்கள்
மருத்துவரை அல்லது
MyCARE டயாபெடிஸ்
எனுகேட்டரை உடன்
தொடர்பு கொள்ளவும். ”



MyCARE

With me, every step of the way

Reference

- Salis S. (2020) Diet in Diabetes Simplified (2nd ed.). Chennai: Notion Press.
- McTavish L, Wiltshire E. Effective treatment of hypoglycemia in children with type 1 diabetes: a randomized controlled clinical trial. *Pediatr Diabetes*. 2011;12(4 Pt 2):381-387.
doi:10.1111/j.1399-5448.2010.00725.x

Issued in Public Interest by



The guide/presentation/content/literature is for general information, guidance and educational purposes only and is not complete or exhaustive. The guide /presentation/content/literature is not intended or implied to replace or substitute any current practice and or advice/guidance/diet provided by healthcare professionals. This guide/presentation/content/literature does not constitute any treatment/therapy/medication/diet/opinions for any patients who are on diabetes medication, the patients are required to prior consult their healthcare professional before acting on any change on treatment/therapy/ medication/diet and/or opinions. USV Private Limited makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability or validity of any information contained in this guide/presentation/content/ literature and will not be liable for any losses, injuries or damages arising from its use.

